

Hydroxyurée / Hydréa®

- Chimiothérapie per os indiquée dans
 - Syndromes myéloprolifératifs / Drépanocytose
 - Chimiothérapie pour tumeurs solides

Toxicité cutanée

- Atrophie cutanée / Erythème facial et des extrémités
- Onychodystrophie et mélanonychies
- **Ulcères cutanés**
 - Hydréa® provoque des ulcères *de novo*
 - Ou limite la cicatrisation d'un ulcère vasculaire

Ulcères de jambe liés à Hydréa®

Localisation

- Uni ou bilatéral
- Péri malléolaire le plus souvent, mais peut se voir partout

Aspect clinique

- Fond fibro scléreux, rarement nécrotique
- Halo inflammatoire péri lésionnel
- **Douloureux ++++++**

Avis spécialisé indispensable

- **Discuter systématiquement la responsabilité d'Hydréa®** dans la genèse de l'ulcère ou dans le retard de cicatrisation
- Discuter l'arrêt du traitement +++++



Prise en charge

Obtenir l'antalgie

- Morphiniques si besoins
- Électrostimulation
- Greffe autologue à visée antalgique

Détersion mécanique à éviter

Pansements humides et occlusifs à éviter

Privilégier

- Interfaces ++++++
- Discuter les dermocorticoïdes sur une courte période
- électrostimulation
- Greffe autologue