Infection locale d'un ulcère de jambe → Conduite à tenir

PLAIE X PERTISE — Savoir & Savoir-faire En Cicatrisation

Critères d'infection locale présents

1 Existe-t-il des signes d'infection extensive

- Érysipèle / Abcès / Écoulement purulent
- Hyperthermie
- Signes locaux de gravité
  - crépitation / douleur intense / hypoesthésie
- Altération de l'état général

Oui →

Avis médical rapide

- **Hospitalisation ?**
- **Antibiothérapie ?**
- **Prise en charge de comorbidités ?**

+

Non →

Lutter contre les facteurs favorisants

- **Equilibrer le diabète**
- **Lutter contre l'œdème → compression adaptée**
- **Lutter contre la dénutrition**
- **Réduire la douleur**

+

Prise en charge de la plaie

- **Soins quotidiens**
- **Lavage eau + savon**
- **Détersion**
- **Limiter et évitez les pansements humides et occlusifs**
- **Pansements**
  - Psmt absorbants → alginate / Fibre HPA / Super absorbant
  - Ou Pansement anti bactérien → Sorbact®

2 Réévaluer à J7 Amélioration ?

Non →

- **Existe-t-il des signes d'infection extensive ?**
- **Les facteurs favorisants sont ils stabilisés**
- **Avis spécialisé souhaitable**

Oui →

- **Réévaluation de la plaie**
- **Reprise d'un protocole de cicatrisation dirigée adapté**