

Mode d'action

- Anti inflammatoire
- Anti mitotique et anti prolifératif
- immunosuppresseur

Indications indispensables

- Atteinte de la PPL *
 - Eczéma
 - Dermatose érosive et pustuleuse
- Étiologies particulières
 - Pemphigoïde bulleuse
 - Pyoderma gangrenosum

* PPL → Peau Péri Lésionnelle

Indications non consensuelles

- Angiodermite
- Dermite d'irritation
- Necrobiose lipoïdique
- Érosions
- Hyper bourgeonnement
- Vascularite
- Botryomycome

En pratique...

Sur décision médicale uniquement → prescription précise

Quelle classe ?

- Classe III (Nerisone / Diprosone / Locoïd)
- Classe IV si pemphigoïde bulleuse ou pyoderma gangrenosum (Derموال / Clarelux)

Quelle quantité ?

- En couche mince
- Sous forme de crème

Quelle fréquence ?

- 1 seule fois par jour

Où l'appliquer ?

- Selon la prescription → PPL* et/ ou plaie

Durée d'application ?

- La plus courte possible
- Selon l'objectif et l'indication → prescription
- Relais par crème émolliente
- Protocole de dégression selon la durée d'application et l'indication
 - Sur prescription médicale précise